


ANEXO N° 3

TRIAGE RESPIRATORIO EN EL NIVEL AMBULATORIO DE ASISTENCIA OBSTÉTRICA

3 de mayo de 2020





TRIAGE RESPIRATORIO EN EL NIVEL AMBULATORIO DE ASISTENCIA OBSTÉTRICA

Al momento del ingreso de la usuaria que concurre a control obstétrico se debe realizar un triage para COVID-19

El objetivo del triage es:




Para identificar si la usuaria presenta riesgo de tener una infección por COVID-19 se le realizan las siguientes preguntas.

¿Tiene usted tos, expectoración, fiebre, dolor de garganta, falta de aire?

Si responde si a alguna de ellas se le pregunta ¿Desde cuándo presenta este síntoma? y ¿qué otros síntomas la acompañan? Ante la presencia de fiebre, tos, malestar general, dolor en garganta o síntomas graves como dificultad respiratoria se considerará paciente de riesgo. Se procederá a:

1. Ofrecerle un tapaboca si no lo tiene.
2. Derivarla, si es posible, a un área específica (en lo posible aislada) para pacientes sospechosas.
3. Informar al profesional que la asistirá de su condición de riesgo para que sea atendida lo antes posible y para que se tomen los recaudos para la utilización de EPP adecuados.



Bibliografía consultada

Manejo en atención primaria del COVID-19 Versión de 17 de marzo de 2020. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf